

U.O.C. DI NEFROLOGIA E DIALISI
Primario dott. W Se Simone

OGGETTO:Regolamento per le prescrizioni farmaceutiche del Reparto di Nefrologia e Dialisi

La tipologia dei pazienti afferenti presso la UOC si compone di pazienti ambulatoriali(ivi compreso dializzati e trapiantati), ricoverati in regime ordinario, di emergenza e di DH..

Tutti i pazienti affetti da anemia secondaria ad insufficienza renale cronica con valori di emoglobinemia al di sotto di 11 g/dl iniziano trattamento con dose di attacco di Eritropoietina (preferibilmente per via sottocutanea nel paziente ambulatoriale e/o endovena nell'emodializzato afferente al Ns Centro Dialisi), per poi proseguire con terapia di mantenimento onde mantenere un livello di emoglobina tra 11 e 12 g/dl, secondo le Linee Guida della Società Italiana di Nefrologia. La prescrizione viene eseguita tramite la compilazione di modello LIT (Libretto terapeutico individuale per i farmaci del Prontuario della Distribuzione Diretta) e la compilazione della scheda di segnalazione e piano terapeutico AIFA specifica per l'EPO, per una durata variabile a seconda delle necessità cliniche del paziente. Ogni prescrizione è annotata su apposito registro.

Il paziente alla prima prescrizione del farmaco dovrà approvvigionarsi presso la Farmacia Ospedaliera e per le erogazioni successive si rivolgerà alla Farmacia dell'ASL o a quelle del territorio.

Analogo iter è previsto per la prescrizione di Sevelamer compresse (e quando la farmacia lo avrà disponibile per il Fozzol),utilizzati in caso di iperfosforemia , Cinacalcet cpr e Paracalcitolo fiale o compresse (utilizzati per il trattamento dell'Iperparatiroidismo secondario), nonché Carnitina fl per os (in caso di carenza secondaria nel paziente dializzato) con la compilazione oltre del LIT, della scheda di segnalazione di diagnosi e piano terapeutico generica.

Al paziente ricoverato viene consegnata, all'atto della dimissione, terapia domiciliare consigliata e modello A con l'indicazione del nome scientifico del prodotto per il ritiro dello stesso, se disponibile, in Farmacia Ospedaliera.

Per le prescrizioni vengono privilegiati i farmaci generici e senza brevetto e quelli del PTO.

Ai pazienti trapiantati viene prescritta terapia immunosoppressiva con Micofenolato (modello H scheda regionale farmaci fascia H OSP 2), Tacrolimus , Tacrolimus a lento rilascio (Advagraf) e Sirolimus e Everolimus (tramite modello LIT + piano terapeutico generico). Ogni prescrizione è annotata su apposito registro.

Per i pazienti in Dialisi Peritoneale Domiciliare si trasmette richiesta materiale direttamente alla ASL di competenza per la fornitura dello stesso al domicilio del paziente.

Si allegano i moduli previsti per la informatizzazione:

- LIT

-Scheda piano terapeutico generica

-Scheda piano terapeutico specifica per EPO + scheda per biosimilare

-Modulo H per prescrizione farmaci fascia H

-Modello A per ritiro farmaci PTH.